

ÜRÜN KATALOĞU



ÜRÜN KATALOĞU

index

Aminocombi®
Depoban®
Banket Enerji®
Macrocow®
Killopec Oral®
Diarrend Oral®
Entero Calf®
Rumexiban®
Epso Set®
Banmag Set®
Magneban Set®
Vanosep®
Bandez®
Ichtiyoban®
Camfomint®
Mentha CETYL®
Zincoban®
Saliban CR®



İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER ŞEY

“Vitamin ve Aminoasit Desteği”



Aminocombi®

► Bileşimi HER 1 LİTRE'DE

Vitamin A (Beta Karoten) 20.000.000 IU, Vitamin D (Kolekalsiferol) 2.000.000 IU, Vitamin E (Alfatokoferol) 10.000 mg, Vitamin K3 500 mg, Vitamin B1 (Tiamin) 2.500mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500mg, Vitamin B5 (Kalsiyum D-Pentonat) 2.500mg, Vitamin B6 (Pridoksin) 500 mg, Vitamin B7 (Biotin) 15mg, Vitamin B12 (Siyankobalamin) 5mg, Kolin 70.000mg, Metiyonin 500 mg, Lizin/L-lizin monohidroklorid 3.000 mg, L-Sistin 100 mg, L-Triptofan 20 mg, L-Treonin 500 mg, Metiyonin hidroksi analogu %87 Metiyonin, Lizin / L-lizin monohidroklorid %78 Lizin, L-Sistin, L-Triptofan, L-Treonin, L-Alanin 1.000 mg, L-Arjinin 600 mg, L-Lösin 600 mg, L-Valin 600 mg, L-İzolösin 200 mg, L-Histidin 200 mg, L-Fenilalanin 500 mg, L-Prolin 800 mg, L-Serin 100 mg, L-Tirozin 200 mg, L-Glutamik asit 4.000 mg

► Kullanım Amacı ve Oranı

Zengin kombinasyonu ile tüm evcil hayvanların vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılan bir beslenme ürünüdür. Hayvanlar sadece L formundaki aminoasitleri kullanabilirler. Aminocombi'deki aminoasitlerin bu formda olması ürünün biyoyararlılığını artırır. Aminocombi düzenli kullanıldığında besi performansının hızla düzeldiği, süt veriminin önemli oranda arttığı görülür. Fizyolojik ihtiyaçların giderilmesi ile hayvanlar daha hızlı gelişir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi ile hayvanlar hastalıklara karşı daha dirençli olurlar. Tavukların özellikle mineral ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanmasıyla yumurta kabuğu kalitesinin istenilen düzeye geldiği ve verimliliğin arttığı görülür. Aşılama esnasında kullanıldığında hem stres faktörleri azaltılır hem de spesifik antikorların daha hızlı oluşması sağlanır. B grubu vitamin ihtiyaçlarının giderilmesi sonucu sinirsel semptomların giderildiği ve metabolizmanın daha düzenli çalıştığı bilinmektedir. Raşitizm, parali, kemik erimesi (osteomalasi) ve kanatlılardaki iskelet bozuklukları (perozis) tedavisinde de kullanılması önerilir. Aminocombi içeriği itibarı ile gerek hormonların yapısındaki direkt rolleri ve gerekse hayvanların fizyolojik fonksiyonlarının düzenli işlemesi ile de üreme işlevleri üzerine önemli bir etkiye sahiptir.

Aminocombi tüm hayvanların taze hazırlanmış günlük içme sularına konularak kullanılır. Koruyucu ve destekleyici olarak günde olarak günde 1 ton içme suyuna 500 cc katılarak kullanılmalıdır. Kuzu ve oğlaklara dozaj pompalı formundan 1-2 pompa/ gün verilebilir.

► Ticari Şekli

250 cc dozaj pompalı karton kutuda, 1 Litre ve 5 Litre olarak kullanıma sunulmuştur.



SAĞLIKLI BÜYÜYEN GÜÇLÜ HAYVANLAR



Depoban®

► Bileşimi HER 1 LİTRE'DE

Bakır: 238mg, Çinko: 623mg, Demir: 1583mg, Kobalt: 228mg, Manganez: 583mg, Kalsiyum: 30.690mg, Magnezyum: 3.192mg, Potasyum: 1.048mg, Sodyum: 1.573mg, Fosforik Asit: 73.000mg, Metiyonin: 10.000mg, L-Lizin: 5.000mg, Distile Su: qsp

► Kullanım Amacı

DEPOBAN bileşimindeki zengin makro ve mikro mineraller ve metiyonin ve lizin gibi esansiyel aminoasitler sayesinde gelişme çağındaki genç hayvanların daha hızlı gelişmesine ve hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağlar. Kalsiyum, Magnezyum ve Fosfor vücudun pH dengesinin oluşmasında önemli bir rol oynarlar. Karbonhidrat ve protein metabolizmasında, kanibalizm tedavisinde ve pika sendromunun giderilmesinde fosforun önemli bir etkinliği vardır. Magnezyum ve Çinko bazı enzim ve hormonların yapısını oluşturur veya etkinleştirir. Demir eksikliğinin anemiye neden olduğu bilinmektedir. B12 eksikliği sonucu oluşan anemiler Kobalt noksanlığından kaynaklanmaktadır. Bakır keratin dokusunun oluşmasında, Demirin hemoglobin sentezi yapımında ve bir çok enzimin yapımını ve etkinleşmesini sağlar. Esansiyel aminoasitlerden metiyonin ve lizin, hem protein sentezinin oluşmasında ve hemde protein sentezi için gerekli bazı aminoasitlerin sentezlenmesini sağlar. DEPOBAN bileşimindeki dengeli ve zengin makro ve mikro mineraller ve aminoasitler dolayısıyla hayvanların hızlı gelişmesini, et ve süt veriminin artmasını sağlar. Bağışıklık sisteminin iyi gelişmesi sonucu hayvanlar hastalıklara karşı daha dirençli olur. Yemden yararlanmayı artırır.

► Kullanım Şekli ve Miktarı

Gebe ve sağmal hayvanlar ve besi hayvanları ile koyun ve keçilerde 25cc/100 Kg. canlı ağırlık 5-7 gün süreyle, kuzu ve oğlaklarda 4-5 cc yeterli miktarda su ile 5-7 gün, tavuklar ve hindilerde 1000 tavuk ve hindi için 1 ton içme suyuna 0,5 Lt 5-7 gün kullanılmaktadır.

► Uyarılar


Oda sıcaklığında ve kuru bir yerde çocukların ulaşamayacağı şekilde saklanmalıdır. Güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır. Bakır bakımından zengin meralarda yetiştirilen koyun ve keçilerde bakır zehirlenmelerine neden olabilir.

► Ticari Şekli

1 Lt, 5 Lt ve 20 Lt plastik ambalajda kullanıma sunulmuştur.



ENERJİ KAYNAĞI



Banket Enerji®

► Bileşimi HER 1 LİTRE'DE

Magnezyum Klorür: 46.500 IU, Kalsiyum Klorür: 121.500 IU, Kalsiyum Propiyonat: 50.000 mg, Gliserol: 300.000 mg, Monopropilen Glikol: 225.000 mg, Dextroz: 118.000 mg, Distile Su: qsp

► Kullanım Amacı ve Miktarı

İnek, koyun ve keçilerde doğumdan önceki ve sonraki yaklaşık 30 günlük süre içerisinde hayvanların yoğun bir enerji ve elektrolit ihtiyacı olduğundan bu süre içerisinde BANKET ENERJİ kullanılması tavsiye edilir. Doğum ve nakil stresi, süt verimi yüksek hayvanların dispoze olduğu süt humması (Hipocalsemi) vakalarında iyi bir destekleyicidir. Sığırların ketozis, prolapsus uteri, uterus involizasyonu, plasenta retensiyonu, tüm tetanik vakalarda ve koyunların gebelik toksemisinde asıl tedaviye destekleyici olarak kullanılır. Doğum sonrası oluşan seksüel siklus bozukluklarında siklusun düzenli seyretmesine ve gizli kızgınlıkların giderilmesinde asıl tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir. Tüm hayvanlarda 1cc/1 kg canlı ağırlık miktarında 3-5 gün süre ile kullanılmalıdır.

► Uyarılar

Aşırı soğuk havalarda kristalleşme yapabilir. Kristalleşme olması halinde 25-30 dakika oda sıcaklığında tutulması yeterlidir. Solüsyon ambalajındaki formuyla kullanılmalıdır. Başka ürün veya ürünlerle karıştırılması halinde niteliği bozulabilir (şelat oluşabilir).

► Saklama Koşulları

Oda şartlarında ve kuru bir ortamda çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edilmelidir.

► Ticari Şekli

500cc'lik plastik ambalajda ve karton kutuda kullanıma sunulmuştur.



SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ BUZAĞILAR



Macrocow®

► Bileşimi HER 1 KG'da

Vitamin A.: 12.500.000 IU, Vitamin D3.: 2.500.000 IU, Vitamin E.: 20.000mg, Vitamin B1.: 800mg, Vitamin B2.: 850mg, Vitamin B6.: 800mg, Biotin: 80mg, Vitamin B12.: 30mg, Çinko.: 5000mg, Demir.: 7.000mg, Bakır.: 5.000mg, Mangan.: 5.000mg, Kobalt.: 500mg, Selenyum.: 5.000 mg, Saccromyces Cerevisae: 500x109, DCP (%18 P,%25 Ca): 50.000mg, Kalsiyum Karbonat.: qsp, Yonca Aroması: 10.000mg

► Kullanım Amacı

MACROCOW oral toz sığır, koyun, kuzu ve oğlakların iz element, vitamin ve probiyotik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış özel bir karışımdır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve stres faktörlerinin ortadan kaldırılması amacıyla kullanılır. İçeriğindeki iz elementler ve vitaminler hayvanların hızlı gelişmesini ve verimliliğini artırır. Metabolizma faaliyetlerinin düzenlenmesi sonucu bağışıklık sisteminin ve üreme döngüsünün fizyolojik düzeylerin üzerinde seyretmesini sağlar. Bileşim yüksek oranlarda A, D ve E vitaminleri ile takviye edildiğinden gelişimin ve et-süt veriminin daha yüksek olmasını sağlar. A ve E vitaminleri hem epitel dokunun gelişmesi ve hemde seksüel faaliyetler üzerinde etkindirler. Yüksek orandaki probiyotik bağırsak mikroflorasının düzenlenmesi ve yemin biyoyararlanımını artırır. Süt emen kuzu ve buzağların ruminal faaliyetlerinin hızla geliştirmesi sonucunda yeme geçiş süresini kısaltır. Başta buzağı ishalleri olmak üzere pek çok enterik bozukluğun giderilmesine yardımcı olur.

► Kullanım Şekli ve Miktarı

Hedef hayvan gruplarından 2 haftalığa kadar olan buzağılara 5 gr/gün, 20 baş kuzu ve oğlağa 5 gr/gün, 1 aylık buzağılara 8gr/gün, 20 kuzu ve oğlağa 10 Gr/gün, 1 aylıktan büyük buzağılara 10 Gr/gün, 20 kuzu ve oğlağa 15 gr/gün miktarlarında verilir. Besi hayvanlarına ve süt ineklerine 5 gr/50 kg vücut ağırlığı miktarında su veya sütle bulamaç yapılarak verilir.

► Uyarılar

Tavsiye edilen miktarlardan fazla ve sürekli verildiğinde A ve D vitaminin vücutta birikerek hipervitaminoza neden olabilir. Kemik kırılmaları, iskelet anomalileri, iç kanamalar oluşabilir. D3 Vitaminin fazlalığı sığılarda zayıflamaya, iskembe tembelliğine neden olabilir. İz elementlerin fazlalığı bazı zehirlenmelerine neden olabilir.

► Ticari Şekli

Karton kutuda 500 Gr ve 1 Kg'lık plastik kavanozda kullanıma sunulmuştur.



İSHALİ DURDURMANIN EN HIZLI YOLU



Killopec Oral®

► Bileşimi HER 1 LİTRE'DE

Sorbitol: 26.000mg, Portakal Aroması: 10.000mg, Pektin: 4.000mg, Kaolin Klay: 190.000mg, Distile Su: qsp

► Kullanım Amacı

Evcil hayvanların bakteri, virüs gibi mikrobiyolojik etkenlerden kaynaklanmayan nonspesifik ishallerinin önlenmesi amacıyla kullanılır. İçeriğindeki kaolin bağırsak çeperini kaplayarak epitel dokunun tahriş olmasını önler. Kaolin aynı zamanda güçlü bir toksin bağlayıcıdır. Bakteri ve virüslerin oluşturduğu toksinlerin yanı sıra ağır metallerin toksinlerindeki de bağlayarak toksinlerin sistemik etkilerini önler. Bileşimdeki pektin su tutucu ve güçlü büzüştürücü etkisi ile ishalin fiziksel olarak durmasını sağlar. Büzüştürücü etkisinden dolayı bağırsak hareketleri fizyolojik düzeye geriler. Bu etkisi ile dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur.

► Kullanım Şekli ve Miktarı

Kaolin çökelti oluşturduğundan dolayı kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Diarre , bakteriyel yada viral kökenli olduğunda oral bir antibakteriyel ajan kullanımı zorunlu ise KILLOPEC ORAL kullanılmadan 2-3 saat önce veya 2-3 saat sonra kullanılmalıdır. KILLOPEC ORAL güçlü bir adsorban ve büzüştürücü olduğundan antibiyotiklerin emilimini engelleyebilir. KILLOPEC ORAL Günde iki kez 25 cc/50 kg canlı ağırlık miktarında kullanılmalıdır. Genellikle bir günlük tedavi yeterlidir.

► Uyarılar

Oda şartlarında ve kuru bir ortamda çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edilmelidir.


► Ticari Şekli

500 cc'lik plastik ambalajda ve kutusunda kullanıma sunulmuştur.



İSHALDE PROFESYONEL ÇÖZÜM

“Bakteriyel Olmayan İshallerde Hızlı Tedavi”



Diarrend Oral®

► Bileşimi HER 1 KG'da

Kaolin Klay: 500.000mg, Tannik Asit: 250.000 mg, Enterococcus Faecium: 100x10⁹, Vanilya Aroması: 50.000mg, Peynir altı suyu tozu 195.000mg

► Kullanım Amacı

Kaolin iyi bir absorban olduğu için diareik hayvanların bağırsak lümenindeki bakteri ve virüslerin oluşturduğu toksinleri bağlayarak toksinlerin sistemik etki göstermesini önler. Aynı zamanda bağırsak epitel dokusunu kaplar, tahriş olmasını engeller. Ortamdaki suyu absorbe ettiğinden dolayı ishalin önlenmesine yardımcı olur. Tannik Asit epitel doku üzerinde büzücü bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda iyi bir antioksidandır. Büzüştürücü özelliğinden dolayı dolaşım sisteminden bağırsaklara su geçişini azalttığından diareik hayvanların sıvı kaybını önler. Peklik oluşturur. Probiyotiklerden Enterococcus Faecium antibiyotiklere ve sindirim sistemin asidik pH'sına karşı oldukça dayanıklıdır. Sindirim sistemi enfeksiyonlarında yararlı mikroorganizmalar hızla azalır, buna karşın patojen bakteri oranı önemli miktarda artar. Enterococcus Faecium değişken ortam koşullarından çok az etkilendiğinden tercih edilen bir probiyotiktir. İçerdiği bu spesifik bileşenlerden dolayı DIARREND spesifik olmayan ishal vakalarında iyi bir çözümdür.

► Kullanım Şekli ve Miktarı

At ve sığır gibi büyük hayvanlarda günde bir defa 50 gr, tay ve danalara 5-10 gr., koyun ve keçilere 5 gr kullanılması yeterlidir. Tedavi 2-3 günü geçmemelidir.

► Uyarılar

Bakteriyel yada viral kökenli diarelerde antibakteriyel bir ürün kullanılacak ise DIARREND uygulamasından 2-3 saat önce veya sonra kullanılmalıdır.

► Ticari Şekli

100 gramlık tifturuk ambalajda 10x100 gr şeklinde kullanıma sunulmuştur



BUZAĞILARINIZ ÖLMESİN

“Buzağı İshallerinde Elektrolit ve Probiyotik Destek”



Entero Calf®

► Bileşimi

HER 1 KG'da

Enterococcus faecium NCIMB 10415*: 30 x 10⁹ cfu, Dekstroz: 225.000mg, Sodyum diasetat: 22.000mg, Potasyum klorür:14.000mg, Sodyum klorür: 35.000mg, Sodyum Bikarbonat: 60.000mg, Vanilya aroması: 7.500mg, Pektin: 2.000mg, Peynir altı suyu tozu: 633.000mg

► Kullanım Sahası / Endikasyonlar


Buzağı ishalleri sonucunda gerçekleşen ölümler enfeksiyon etkeninden ziyade sıvı ve elektrolit kayıplarından kaynaklanmaktadır. Elektrolit tedaviye ne kadar erken başlanırsa buzağının yaşama şansı o kadar yüksek olur. ENTERO CALF'la sodyum, potasyum, klor gibi elektrolitlerle ishal sonucunda oluşan elektrolit ve su açığını kapamaya yardımcı olur. Glikoz sayesinde ishal sonucu dışkı ile atılan glikozu ve ortaya çıkan enerji açığını kapamaya yardım eder. İçeriğinde bulunan yüksek düzeydeki probiyotik patojen mikroorganizmaların kullandığı besin maddelerini tüketir ve tutundukları bağırsak epitellerine bağlanarak bunların yerleşmesini engeller ve bu patojenlere karşı anti-mikrobiyel ürünler sentezleyen bağırsıklığı uyararak bağırsak florasının kolonizasyonuna etki ederek ishalin bitmesine ve önlenmesine yardımcı olur.

► Ambalaj Şekli ve Kullanım Dozu

Piyasaya 100 gramlık ambalajlarda sunulan ENTERO CALF 1-1,5 litre su veya süt ile karıştırılarak bir öğünde buzağıya verilir. Günlük öğün sayısı en az 2 en fazla 4 olmak üzere uygulamaya 2-7 gün arasında devam edilir.



MİDE VE BAĞIRSAK SORUNLARINA PROFESYONEL ÇÖZÜM



Rumexiban®

► Bileşimi

HER 1 KG'da

Vitamin: B12 (Siyanokobalamin) 40mg, Mangan: 18.600 mg, Demir: 15.000mg, Çinko: 21.600mg, Bakır: 7.504mg, Kobalt: 248mg, Saccharomyces Cerevisa 280x109 Cfu, DL-Metiyonin : 40.000mg, Kalsiyum Propiyonat: 320.000mg, Magnezyum Oksit: 406.400mg, Sorbitol: 56.000 mg

► Kullanım Amacı

RUMEXIBAN içeriğindeki Kalsiyum Propiyonat etkisiyle siğırlarda ketozis ve koyunların gebelik toksemilerinde kullanılır. Bileşimdeki propiyonik asit Kalsiyum Propiyonat'tan ayrışarak glikojenik özellik gösterir. Metiyonin hem aktif olarak protein sentezinde rol oynar, hem karaciğerin yağlanması önleyerek karaciğerin korunmasını sağlar ve hemde iyi bir metil kaynağıdır. Sorbitol karaciğer fonksiyonlarını aktive ederek safra salınımını artırır. Safra salgısı yağların emülsiyonunu artırdığından yağda çözünen vitaminlerin daha fazla emilmesini sağlar. Kalsiyum Karbonat iyi bir pH dengeleyicidir. RUMEXIBAN içeriğindeki temel iz elementler yaşamsal öneme sahiptir. Gerek rumen mikroflorasının çoğalması ve aktive olmasında gerekse enzim ve hormonal faaliyetlerin düzenlenmesinde rol alırlar. Saccromyces Cervisiae çeşitli nedenlerle bozulmuş veya baskılanmış rumen mikroflorasının fizyolojik düzeylerine gelmesini sağlar. RUMEXIBAN aşırı protein ve karbonhidrat tüketimine bağlı olarak oluşan asidoz ve alkaloziz durumlarında kullanılır. Küflü ve bozuk gıdaların neden olduğu sindirim bozuklukları ve hipoglisemi ve bağlı olarak oluşan asetonemi vakalarında kullanılması gerekir. Rumen mikroflorasının düzenlenmesini sağladığından hayvanların gıdalardan daha fazla yararlanmasını sağlar. Spesifik olmayan belirsiz ishallerin tedavisinde de kullanılabilir.

► Kullanım Dozu

Siğırlara 1Lt suyun içine 125 gr, koyu ve keçilere 25gr uygun miktarda suya katılarak 3 gün süreyle kullanılması gerekir.

► Ticari Şekli

125 gramlık tifturuk ambalajda 125x10 Adet karton kutuda kullanıma sunulmuştur.



KABIZLIĞA PROFESYONEL ÇÖZÜM



Epso Set®

► Bileşimi

HER 1 KG'da

Sodyum Klorür: 180.000mg, Sodyum Bikarbonat: 360.000mg, Sodyum Sülfat: 440.000mg, Potasyum Sülfat: 20.000mg

► Kullanım Amacı

Antiasit ve Laksatif etkili beyaz kristalize ve suda homojen olarak eriyen bir tozudur. Konstipasyonlarda ve Asidoz vakalarında kullanılması önerilir. Sindirim sisteminin pH değerini düzenler. Bağırsak peristaltikini artırır.

► Kullanım Şekli ve Miktarı

Veteriner hekimin önerileri de dikkate alınarak sığır ve atlarda 100 gr, koyun ve keçilerde 15 gr ılık suda eritilerek içirilir. Vakanın şiddetine göre doz iki katına çıkarılabilir.

► Uyarılar

Oda sıcaklığında kuru bir ortamda ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır. İçeriğindeki Sodyum Bikarbonat'tan dolayı diğer oral ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

► Ticari Şekli

250 gr ve 500 gr doypack ambalajda kullanıma sunulmuştur.



ASİDOZ TEDAVİSİNDE TEMEL DESTEK



Banmag Set®

► Bileşimi

HER 1 KG'da

Sodyum Bikarbonat: 240.000mg, Magnezyum Oksit (% 60'lık): 480.000mg, Kalsiyum Karbonat: 280.000mg

► Kullanım Amacı

İçeriğindeki sodyum bikarbonat ile vücut pH'sını dengelemek suretiyle asidozun tedavisinde, magnezyum oksit'in güçlü absorpsiyon etkisiyle midede asidoz sonucu oluşan amonyak gazının emilmesi için kullanılır. Kalsiyum karbonat içirildikten hemen sonra ayrışır. Ayrışan karbonat mide asiditesini nötralize etmeye yardımcı olur. Açığa çıkan kalsiyum ise bağırsaklardan emilerek vücudun kalsiyum ihtiyacına katkı sağlar.

► Kullanım Şekli ve Miktarı

3-5 Gr/10 Kg canlı ağırlık miktarında 3 gün süreyle ılık suda eritilerek kullanılır.

► Uyarılar

Oda sıcaklığında kuru bir ortamda ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır.

► Ticari Şekli

250 Gr ve 500 Gr'lık doypack ambalajda kullanıma sunulmuştur.



KABIZLIĞA ETKİLİ ÇÖZÜM



Magneban Set®

► Bileşimi

HER 1 KG'da

Sodyum Klorür: 20.000mg, Magnezyum Sülfat Heptahydrate: 979.000mg, Portakal Aroması: 1.000mg

► Kullanım Amacı

Sodyum Klorür'ün ve Magnezyum Sülfat'ın yüksek oranda su bağlamasından dolayı çoğunlukla laksatif etkisinden faydalanılır. Sindirim düzensizliklerinin giderilmesinde ve safra salgılarının düzenleyici özellikleri nedeni ile karaciğer fonksiyon bozukluklarında alternatif tedavi olarak da önerilebilir.

► Kullanım Şekli ve Miktarı

Tüm hayvanlarda günlük doz 1 Gr/5 Kg canlı ağırlık olarak ılık suda eritilerek kullanılır.

► Uyarılar

Oda sıcaklığında ve kuru bir ortamda ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Oluşturduğu diyardı nedeni ile dehidrasyona ve elektrolit kayıplarına neden olmamak için uzun süreli kullanımlardan kaçınılmalıdır.

► Ticari Şekli

250 Gr ve 500 Gr'lık doypack ambalajda kullanıma sunulmuştur.



ŞAP TEDAVİSİNDE ÇÖZÜM

“Kümes ve Ahırlar İçin İyotlu Genel Dezenfektan”



Vanosep®

► Bileşimi HER 1 LİTRE'DE

VANOSEP, %2-2,25 iyodin, %12.5-13,25 fosforik asit ve %8-8,8 sülfürik asit içeren asidik özellikli, koyu kahverenginde akışkan bir yüzey temizleyicidir.

► Kullanım Amacı ve Oranı

Tüm çiftlik hayvanlarının barınaklarının ve içme sularının temizliği amacıyla sulandırılarak kullanılır. Ayak ve derinin yüzeysel yaralanmalarında 1/250, içme sularının temizliği amacıyla 1/1600, ahır, ağıl ve kümeslerin temizliği amacıyla 1/300 ve bazı derin yaralanmaların temizliği amacıyla sulandırılmadan kullanılması tavsiye edilir. Alet ve ekipmanlarda korozyona neden olduğundan dolayı kullanılması tavsiye edilmez.

► Genel Uyarılar ve Önlemler

VANOSEP'in etkin olarak çalışması için uygulanacak yüzeyin fiziksel temizliğinin yapılmış olması gerekir. Asidik özellikli deterjanlar düşük çevre ısılarında daha aktiftirler. Bu nedenle sıcak havalarda veya ortamlarda kullanılması tavsiye edilmez. Yüksek ısı derecelerinde iyot buharı zararlı olabilir. Konsantr haldeki kullanımı deriye ve göze zarar verir. Amonyum tuzları, hipokloritler ve alkali çözeltilerle karıştırılması zehirlenmelere neden olabilir. Alüminyum ve alaşımlarıyla temas ettirilmemelidir.

► Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve çocukların ulaşamayacağı bir şekilde muhafaza edilmelidir.

► Ticari Şekli

1 Lt ve 5 Lt'lik plastik ambalajda kullanıma sunulmuştur.



SAĞLIK TEMİZLİKLE BAŞLAR

“Barınak ve Ekipman Temizliğine Genel Çözüm”



Bandez®

► Bileşimi

BANDEZ, %20 oranında Benzalkonyum Klorür içeren katyonik deterjan niteliğinde karakteristik kokulu vizkoz, renksiz berrak bir çözeltidir.

► Kullanım Amacı ve Oranı

Tüm hayvan barınaklarında, hayvan yetiştiriciliği amacıyla kullanılan tüm ekipmanlarda, süt sağım makinalarında genel sanitasyon amacıyla kullanılır. Deterjan niteliğinde olduğundan operasyon alatlerinin temizlenmesi amacıyla 1/200, yara, yanık ve derinin yüzeysel tahrişlerinde ve sağım makinalarının temizliği amacıyla 1/1000, kümes ve ekipmanlarının sanitasyonu ahır, ağıl ve boks gibi barınaklarda da aynı amaçla 1/500 oranında sulandırılarak kullanılır.

► Uygulama Şekli

Ayıklarda, ayak banyosu ve ıslak bandaj şeklinde kullanılır. İçeride hayvan bulunmaması koşulu ile pulverizasyon şeklinde de kullanılabilir. Hayvanlar içeri alınmadan 2-3 saat önceden barınağın havalandırılması önerilir. Belirtilen sulandırma oranları doğrultusunda yıkama şeklinde de kullanılabilir.

► Genel Uyarılar

BANDEZ konsantre çözelti halinde (sulandırılmamış halde) kullanıldığında göze, deriye ve mukozalara zarar verebilir. Deriye ve mukozaya bulaştırılmış ise 15-20 dakika süreyle temiz suyla yıkanmalıdır. Göze bulaşmış ise bir doktora danışılmalıdır.

► Ticari Şekli

1 Lt ve 5 Lt'lik plastik ambalajda satışa sunulmuştur.



HIZLI İYİLEŞEN APSELER SAĞLIKLI HAYVANLAR

“İchtammol İçeren Deri Bakım Kremi”



Ichtiyoban®

► Bileşimi

Petrolatum ichtammol, 1,3 - Bis (hidroksimetil) - 5,5 dimetimidazolit - 2,4 diyon

► Kullanım Amacı Ve Oranı

İCHTIYOBAN hafif iritan etkisi olan,astrenjan etkili, kahverengi koyu kıvamlı bir merhemdir. Aynı zamanda antiseptik özelliğindedir. Tahriş olmuş, psoriasisli, akneli deride astrenjan ve antiseptik özelliğinden dolayı derinin daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. İritan etkisi ile muhtelif nedenlerle oluşmuş apselerin olgunlaşmasını sağlar. İCHTIYOBAN günde iki kez yara yüzeyine ince bir tabaka halinde sürülür. 2 gün süre ile kullanılması yeterlidir.

► Uyarılar

Oda sıcaklığında,kuru ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Uzun süreli ve fazla miktarda kullanılması iritan etkisinden dolayı yaranın derinleşmesine ve büyümesine neden olabilir. Yeterli miktarda ve kısa süreli kullanılması tavsiye edilir.

► Ticari Şekli

Karton kutu içinde 100 gramlık plastik kutuda kullanıma sunulmuştur.



HIZLI İYİLEŞEN APSELER SAĞLIKLI HAYVANLAR

“Kafur ve Mentol İçeren Deri Bakım Kremi”



Camfomint®

► Bileşimi

Petrolatum, camphor, 1,3 - Bis (hidroksimetil) - 5,5 dimetimidazolit - 2,4 diyon

► Kullanım Amacı Ve Oranı

CAMFOMINT içerdiği kafur nedeni ile kendine özgü keskin bir kokusu, rezolütif ve skatrizan özelliği olan beyaz renkli yoğun kıvamlı bir kremdir. Yara ve yanıkların tedavisinde, akne ve spesifik olmayan deri kaşıntılarında kullanılır. Kafurun hafif analjezik özelliğinden dolayı uygulandığı bölgenin rahatlamasını ve ferahlamasını sağlar. Bu nedenle böcek sokmalarında da kullanılabilir. Günde iki kez yeteri miktarda CAMFOMINT yara bölgesine 2-3 dakika ovularak sürülmelidir. 2 gün süre ile kullanılması yeterlidir.

► Uyarılar

Oda sıcaklığında, kuru ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmeli ve gıda maddelerinden uzak tutulmalıdır. Yoğun iritan etkisinden dolayı uzun süreli kullanılmasından kaçınılmalıdır. Önerilen kullanım şekli ve süresinin dışında kullanılması halinde uygulandığı bölgede püstül ve veziküllerin oluşmasına neden olabilir.

► Ticari Şekli

Karton kutu içinde 100 gramlık plastik kutuda kullanıma sunulmuştur.



MASTITİS'TE HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜM



Mentha CETYL®

► Bileşimi

Camphor, Menthol, Parafinum Liquidum, Polysorbate, Carbomer, 1,3 Bis (hydroxymethyl) - 5,5 - dimethylimidazolidine - 2,4 - dine

► Kullanım Amacı Ve Oranı

Mentha Arvensis yağının extratı olan Menthol Crystalline uygulandığı bölgenin rahatlamasını,soğumasını ve kan dolaşımının belirgin ölçüde artmasını sağlar. Bu etkisiyle uygulandığı bölgedeki ödemi giderir. Tüm evcil hayvanların kas, eklem ve tendonlarında oluşan ağrı ve şişliklerin tedavisinde ana tedaviye yardımcı olarak önerilir. Parafinum Liquidum MENTHA CETYL'in uygulandığı bölgenin daha uzun süre yumuşak kalmasını sağlar. İçeriğindeki Polysorbate ve Carbomer ile MENTHA CETYL'in etkinliği uzun süre devam eder. Mastitislerde, ana tedavinin daha etkin olmasında önemli bir rolü vardır. Günde 2 defa yeter miktarda derinin üzerine ince bir tabaka halinde kullanılır. 2-3 günlük uygulama yeterlidir.

► Uyarılar

Oda sıcaklığında kuru bir ortamda ve çocukların ulaşamayacağı bir ortamda bulundurulmalıdır. Gıda maddelerine temas ettirilmemelidir. Uzun süreli ve fazla miktarda kullanılması yaraların derinleşmesine ve kalıcı hasarlara neden olabilir.

► Ticari Şekli

Karton kutuda 100 gramlık plastik ambalajda kullanıma sunulmuştur.



AÇIK YARALARDA ÇİNKO OKSİT DESTEĞİ

“Açık Yaralarda Hızlı Büzüşme”



Zincoban®

► Bileşimi

Petrolatum, Zinc Oxide, 1,3 Bis(hydroxymethyl)- 5,5 -dimethylimidazolidine - 2,4 - dione

► Kullanım Amacı Ve Oranı

Spesifik veya nonspesifik tüm dermatozlarda, süt ineklerinin meme tahriş ve pişiklerinde kullanılır. Derinin epitel hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Antiseptik özelliktedir. Yeter miktarda derinin hasarlı kısmına ince bir tabaka halinde günde 2 defa 3-4 gün kullanılır.

► Uyarılar

Oda sıcaklığında kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Gıda maddelerine temas ettirilmemelidir.

► Ticari Şekli

Karton kutuda 100 gramlık plastik kutuda kullanıma sunulmuştur.

AÇIK YARALARA ANTİSEPTİK BAKIM

“Salisilik Asit İçeren Deri Bakım Kremi”



Saliban CR®

► Bileşimi

Petrolatum, salisilik asit, 1,3 - Bis (hidroksimetil) - 5,5 dimetimidazolit - 2,4 diyon

► Kullanım Amacı Ve Oranı

Saliban CR bileşimindeki salisilik asit nedeniyle kristalize yapıda, renksiz, kokusuz, yoğun kıvamlı bir deri bakım merhemidir. Keratolitik, asit karakterinden dolayı antiseptik ve hafif analjeziktir. Antiseptik özelliği nedeni ile yara yüzeylerinin temizlenmesi ve hafif mikozların tedavisinde önerilebilir. Keratolitik olması özellikle meme uçlarında oluşan nedbe dokuların giderilmesi amacıyla kullanılabilir. Uygulandığı bölgede derinin uzun süre yumuşak kalmasını sağlar. Günde 2-3 kez yeter miktarda deriye 2-3 dakika ovularak sürülür. Yara, nedbe ve mikozlar iyileşinceye kadar tedaviye devam edilir.

► Ticari Şekli

Karton kutu içinde 100 gramlık plastik kutuda kullanıma sunulmuştur.

www.bandirmaecza.com.tr

O 266 718 46 46

ÜRÜN KATALOĞU



Bandırma Ecza Deposu

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sunullah Mh. Çanakkale asfaltı üzeri No:34

Bandırma / BALIKESİR

T: +90 266 718 46 46